

| Habitatype 1330: Schorren en zilte graslanden Hectares kweldervegetatie (zonder pionierzone) | Referentie op basis % 1600-1800 | Referentie GET | Areaal 1980 | Areaal 1990 | Areaal 2000 |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| NL Dollard brak * | 1000 | 700 | 796 | 755 | 661 |
| Groninger kwelder ** | 4650 | 1100 | 884 | 974 | 913 |
| Friese kwelder ** | 1900 | 1100 | 1095 | 1355 | 1248 |
| N-H schorren * | 0 | 500 | 19 | 18 | 38 |
| Totaal vastelandkwelders Waddenzee | 7550 | 3400 | 2793 | 3102 | 2860 |
| Oost: Ts Bosplaat-Rottum | 2800 | 2000 | 2197 | 2273 | 2562 |
| West: Texel-Ts Noordvaarder * | 3500 | 500 | 151 | 150 | 255 |
| Noordzee Sluifers * | | 500 | 255 | 252 | 237 |
| Totaal eilandkwelders Waddenzee | 6300 | 3000 | 2603 | 2675 | 3054 |

* GET incl. pionierzone . 5%

GET = Goede Ecologische Toestand (herberekend naar Dijkema et al. 2005)

** GET gezamenlijk beoordelen als 2200 ha

Ca. 1100 ha zomerpolders Noard Fryslan Butendyks, daarvan in 2001 135 ha is verkwelderd. Zomerpolder Peazemerlannen is 89 ha.

Getallen 1980-2000 van vegetatiekaarten RWS-DID, gepubliceerd in:

Dijkema, K.S., De Jong, D.J., Vreeken-Buijs, M.J. & Van Duin, W.E., 2005. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water. Ontwikkeling van Potentiële Referenties en van een Potentiële Goede Ecologische Toestand. .

Alterra-TEXEL, WageningenUR; Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg; Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-informatie en ITC, Delft. RIKZ/2005.020. 62 p

Getallen 1600-nu van historische kaarten, gepubliceerd in:

Dijkema, K.S. 1987. Changes of salt-marsh area in the Netherlands Wadden Sea after 1600.

In: A.H.L. Huiskes, C.W.P.M. Blom & J. Rozema (eds), Vegetation between land and sea. Junk, Dordrecht; 42-49


| Habitatype 1310: Zilte pionierbegroeiingen Hectares pioniervegetatie (> 5% bedekking) | Referentie GET *** | Areaal 1980 | Areaal 1990 | Areaal 2000 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| NL Dollard brak | | | | 79 |
| Groninger kwelder *** | 375 | 930 | 542 | 334 |
| Friese kwelder *** | 375 | 647 | 261 | 520 |
| N-H schorren | | 15 | 17 | 33 |
| Totaal vastelandkwelders Waddenzee | | 1592 | 820 | 967 |
| Oost: Ts Bosplaat-Rottum | | 211 | 217 | 294 |
| West: Texel-Ts Noordvaarder | | 39 | 38 | 46 |
| Noordzee: Slufter-Texel | | 31 | 42 | 20 |
| Totaal eilandkwelders Waddenzee | | 281 | 296 | 359 |

*** WOK monitoring meetvakken; GET = Goede Ecologische Toestand, gezamenlijk beoordelen als 750 ha

correctie 20-3-2008: jaarlijkse WOK monitoring op basis meetvakken

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| | 1980 | 1990 | 2000 |
| groningen | 930 | 542 | 334 |
| friesland | 647 | 261 | 520 |

areaal kwelders waddenzee



areaal zilte pionier waddenzee

